

របៀបការពារសុខភាពទារក និងសុខភាពរបស់អ្នកផ្ទាល់ ប្រសិនបើ អ្នកមានរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B និងកំពុងមានផ្ទៃពោះ



រោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលទារករបស់អ្នកអាចផ្ទុកអស់មួយជីវិត។ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ និងមានរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B វិរុសនេះអាចចម្លងទៅទារកទើបនឹងកើតរបស់អ្នកតាមការប៉ះពាល់ជាមួយឈាមរបស់អ្នកនៅពេលកើត។ ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យឆ្លងរោគទៅទារក និងជួយឱ្យអ្នកបន្តមានសុខភាពល្អ សូមទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឱ្យបានទាន់ពេល ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងពិគ្រោះជាមួយពួកគេអំពីរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B។

សូមប្រើតារាងនេះដើម្បីតាមដានការថែទាំរបស់អ្នកនិងការថែទាំទារករបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ!

សម្រាប់ម្តាយ

អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

- ✓ សូមទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដើម្បីទទួលបានការថែទាំសម្រាប់រោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B ឱ្យបានទាន់ពេលក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដើម្បីពិនិត្យមើលកម្រិតរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B និងមុខងារធ្វើមរបស់អ្នក។
 - អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់រោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B ប្រសិនបើចាំបាច់។

នៅពេលកើត

- ✓ សូមប្រាកដថាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យដឹងថាអ្នកមានរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B។
- ✓ សូមប្រាកដថាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលនឹងថែទាំទារករបស់អ្នកដឹងថា អ្នកមានរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B។

ក្រោយពេលកើត និងបន្តបន្ទាប់

- ✓ ពេលអាយុ 1-2 ខែ សូមបន្តទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការថែទាំសម្រាប់រោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B។
 - ចំណុចនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើអ្នកបានចាប់ផ្តើមការព្យាបាលអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។
- ✓ សូមបន្តទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ដើម្បីតាមដានរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B យ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ 6 ខែម្តង។

សម្រាប់ទារក

នៅពេលកើត

ទារកត្រូវតែចាក់ថ្នាំ 2 ដងក្នុងចន្លោះ 12 ម៉ោងបន្ទាប់ពីកើតមក ដើម្បីការពារកុំឱ្យឆ្លងរោគ៖

- ✓ កូប៉ូយលីនបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B (HBIG) មួយម្តង
- ✓ វ៉ាក់សាំងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B លើកទី 1

1-2 ខែ

- ✓ ទារករបស់អ្នកដល់ពេលចាក់វ៉ាក់សាំងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B លើកទី 2។

6 ខែ

- ✓ ទារករបស់អ្នកដល់ពេលចាក់វ៉ាក់សាំងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B លើកទី 3។

9-12 ខែ

- ✓ ទារករបស់អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តឈាម ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B និងវាយតម្លៃកម្រិតការពាររបស់ទារក។

ការបំបៅដោះកូន

- ✓ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអំពីជំនួយផ្នែកបំបៅដោះកូន និងរបៀបបង្ការ ឬគ្រប់គ្រងក្បាលដោះដែលហូរឈាមឬប្រេ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់របស់ទារកជាមួយឈាមរបស់អ្នក។
- ✓ ប្រសិនបើទារកទើបនឹងកើតបានចាក់វ៉ាក់សាំងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B និងកូប៉ូយលីនបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B នៅពេលសម្រាល នោះហានិភ័យនៃការចម្លងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B ពីម្តាយទៅទារកតាមរយៈការបំបៅដោះកូនគឺទាបណាស់។ បន្ទាប់ពីទារកចាក់ថ្នាំទាំងនេះហើយ អ្នកអាចបំបៅដោះកូនដោយសុវត្ថិភាព។



ត្រូវប្រាកដថាដៃគូរបស់អ្នក និងអ្នកដែលរស់នៅជាមួយអ្នក ធ្វើតេស្ត និងចាក់វ៉ាក់សាំងរោគរលាកធ្វើមប្រភេទ B អំឡុងពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ។