

که چېرې تاسو د B هېټایټ یا ژیری لری او میندواره یاست، څه ډول کولای شئ چې د خپل ماشوم او ځان روغتیا خوندي کړئ

د هېټایټ B یا ژیری یوه جدي ناروغي ده، چې بڼایي ستاسو ماشوم یې د عمر تر پایه پورې ولري. که چېرې تاسو میندواره یاست او د B هېټایټ یا ژیری لری، دا ویروس کولای شي د زیږون پر مهال ستاسو له وینې سره د اړیکې له لارې ستاسو پر ماشوم اغیزه وکړي. د خپل ماشوم له اخته کېدو څخه د مخنیوي او د خپل ځان د روغ ساتلو لپاره، د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کونکي سره د مینواری په لومړیو کې وینئ تر څو له دوی سره د B هېټایټ یا ژیری په اړه خبرې وکړئ.

له دې جدول څخه د میندواری پر مهال او له هغې وروسته د خپل ځان او ماشوم د روغتیا د څارنې په موخه کار واخلئ!

د زیږون پر مهال

تجویز کړي

- له اخته کېدو څخه د خوندیتوب په موخه نوی زیربډلی ماشوم باید له زیږون وروسته د 12 ساعتونو په لړ کې 2 واکسینونه ترلاسه کړي:
- یو واکسین د B هېټایټ یا ژیری د خوندیتوب گلوبین (HBIG)
- د B هېټایټ یا ژیری 1 واکسین

له 1-2 میاشتو عمر پر مهال

- ستاسو ماشوم باید د B هېټایټ یا ژیری 2 واکسین ترلاسه کړي.

د 6 میاشتو د عمر پر مهال

- ستاسو ماشوم باید د B هېټایټ یا ژیری 3 واکسین ترلاسه کړي.

له 9-12 میاشتو عمر پر مهال

- ستاسو ماشوم د وینې معاینې ته اړتیا لري تر څو د دوی د B هېټایټ یا ژیری حالت چک شي او د خوندیتوب کچه یې و ارزول شي.

د مور د شیدو ور کول

- د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کونکو سره د مور د شیدو د ورکولو د ملاتړ او دا چې څه ډول کولای شو د سینو چاودېلي او یا وینې شویو څوکي په داسې ډول مدیریت کړو چې ستاسو له وینې سره د ماشوم د اړیکې را کمه کړو.
- که چیرې ماشوم د زیږون پر مهال د B هېټایټ یا ژیری واکسین او د B هېټایټ یا ژیری د خوندیتوب گلوبولین ترلاسه کړل، د شیدو له لارې له مور څخه ماشوم ته د B هېټایټ یا ژیری د لېږد خطر ډېر کم دی. کله چې ستاسو ماشوم دا واکسین ترلاسه کړي، د مور شیدي ور کول بهی خطر دی.

د میندواری پر مهال د میندو

لپاره

- د میندواری په لومړیو کې د B هېټایټ یا ژیری ته د پاملرنې په موخه د روغتیايي خدمتونو یوه چمتو کوونکي ته مراجعه وکړئ تر څو تر څو خپل د B هېټایټ یا ژیری کچه او د خپل فعالیت چک کړئ.
- ستاسو د روغتیايي خدمتونو چمتو کوونکي کولای شي د اړتیا په صورت کې د زیږون پر مهال د B هېټایټ یا ژیری درمل.

تجویز کړي

- ډاډ ترلاسه کړئ چې د روغتون کار کوونکي پوهیږي چې تاسو د B هېټایټ یا ژیری لری.
- ډاډ ترلاسه کړئ چې د روغتیايي خدمتونو هغه چمتو کوونکي چې ستاسو ماشوم ته پاملرنه کوي پوهیږي چې تاسو د B هېټایټ یا ژیری لری.

له زیږون وروسته او له هخوا

- په 1-2 میاشتو کې، د B له هېټایټ یا ژیری څخه د پاملرنې په موخه د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کوونکي سره تعقیبي ناسته ترسره کړئ.
- دا په ځانګړې توګه هغه وخت ډېر مهم دی که چیرې تاسو د میندواری پر مهال درملنه پیل کړي وي.
- لږ تر لږه په هرو 6 میاشتو کې، د B له هېټایټ یا ژیری د څارنې په موخه د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کوونکي سره تعقیبي ناسته ترسره کړئ.

ډاډ لاسته راوړئ چې ستاسې د ژوند ملګری او نور هغوی چې تاسې ورسره ژوند کوئ، ستاسو د میندواری پر مهال یې د B هېټایټ یا ژیری معاینه او واکسین کړي دي.

